


「咲き」が違う! 「実り」が違う!

花と実のための秘密技

高純度アミノ酸パワー



はなかがみ
『花果神L』は味①素株式会社が開発した高純度アミノ酸による植物の生長と果実の品質向上技術ライセンスを受け、昭光通商アグリ株式会社が肥料として商品化したものです。
登録番号 生第85058号

 昭光通商アグリ株式会社

 昭光通商アグリ株式会社

はなかがみ
花果神L・育王の詳細はホームページでもご案内しています。

<http://shokoagri.com>

 昭光通商アグリ株式会社

荷姿18g×10袋×20/ケース
72g×6本×10/ケース

はなかがみ 花果神L

液体タイプ

花と実のための秘密技 高純度アミノ酸パワー

- はなかがみ
花果神Lは特に植物の生殖生長に必要な高純度アミノ酸（プロリン）を主成分にしております。プロリンは植物の生長、花芽形成、果実・子実の品質向上に関与しています。
- はなかがみ
花果神Lを使用することで、花芽の形成をスムーズにし、着果促進、果実の肥大促進、増収、品質向上が期待されます。
- はなかがみ
花果神Lのプロリンは、植物が各種のストレス（日照・気温・水分・塩類など他）を受けたとき、自らを保護するために生成する天然（安全）の抗ストレス成分です。

使用方法（例）

作物名	葉面散布の場合
水稲類	幼穂形成時、開花期、及び乳熟期に各々散布してください。
果菜類 花き類 豆類	生殖生長期（花芽分化期・開花期・果実肥大期）に7～10日間隔で定期的に散布してください。
芋根菜類	生殖生長期（地下部肥大期）に7～10日間隔で3回程度散布してください。
果樹類	花芽形成期、及び開花後、3回以上定期的に散布してください。
芝草	天候によるストレス（温度、日照）の回避に適宜散布してください

- ※散布は1袋（18g）を100～250リットルに希釈して下さい。
- ※葉面散布剤、農薬（一部の農薬を除く）の混用は可能です。
単用の場合は、展着剤の使用をお勧めします。
- ★灌水処理を行う場合は、10a当たり4袋（72g）を希釈してご使用ください。（全ての作物にご使用できます。）
詳細については、取扱店または昭光通商アグリ（03-3459-5215）にお問い合わせください。

● 使用上の注意点

- 1) 希釈後は直ちに使用してください。
- 2) 食品ではありません。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 原液が目に入ったり皮膚に付着した場合は、清潔な水でよく洗ってください。
- 4) 本来の目的以外には使用しないでください。
- 5) 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

粉状

（高純度プロリン粉末）

はなかがみ
花果神



10g×10袋（小箱）
出荷単位：20箱（小箱）/ケース

植物根生育剤「育王」との
併用が効果的です。



姉妹品

「育王」

好評発売中!

登録番号 生第 84382号

はなかがみ

花果神L・育王の詳細はホームページでもご案内しています。 <http://shokoagri.com>