

# 高品質ガーベラ栽培のための秘密技

—植物根生育促進剤「育王」・高純度アミノ酸「花果神」・土壌再活性材「再活ドライフロアブル」の使用—

<b>「育王」は</b> 定植時や樹勢低下前に使用する事で、根を旺盛にし生育促進する。	<b>「花果神」は</b> 抗ストレスアミノ酸を含有し、生育期間を通じて受けるストレス(高温・日照不足等)に対する抵抗力を増す。花芽形成に参与している。
--	---

使用目的	使用 方 法	効 果 ・ 備 考
定植時	育王1000倍希釈液を水槽に作り、苗の入ったトレーをそのままドブ浸けする。 (鉢土の芯まで十分に濡れるようにしてください。)	活着促進＝欠株率の低下＝初期生育がスムーズ
樹勢低下時	本圃栽培時：特に樹勢の低下する時期（夏）に2週間に1回育王を灌水処理 (10a当り育王500gを灌水時に使用：希釈倍率は1000倍以上であれば良い) 但し水耕栽培の場合は、10000倍以上に薄める事	根量が増すことによりしっかりとした生育を促す。 従来より肥料の要求量が増すため、 徐々に肥料濃度を上げてください（EC2.0を目安に）
花質向上	花果神を25000倍を目安（250ℓの水に花果神1：10g）に溶解し灌水又は葉面散布 10日程度の間隔で使用してください。	肥料・農薬との混用可能 葉色がアミノ酸色（※）になる。 葉肉が厚く、葉が立ったような形状になる。

※アミノ酸色とは、アミノ酸が吸収されることにより、葉にツヤが出て、日当たりのいいところでは黄緑色、日陰では濃い緑色に見えます。このような葉の状態をアミノ酸色と表現します。

3年生の栽培の場合、ベツに残根が蓄積してきます。  
こうした残根など未熟有機物は、ハウス内の気温(地温)が上昇し、腐熟する際有害なガス(アンモニア等)を発生させます。  
このガスは土壌中に停滞し、根の生育を阻害することが有ります。  
対策として土壌再活性材「再活ドライフロアブル」を灌水の際に混用して下さい。  
使用方法:5000~10000倍希釈(1ヶ月に1回)

お問い合わせは  
 菊川市牛淵2115-7  
 株式会社松本商店  
 (0548)27-2122

製造・発売元  
 東京都港区芝公園2-4-1  
 昭光通商アグリ株式会社  
 (03)3459-5221